

## LA FAUNE SAUVAGE

Depuis 40 ans, la grande faune s'est multipliée. Les populations sont aujourd'hui de l'ordre de **600 à 700 cerfs et biches**, **200 chevreuils**, avec un accroissement annuel de près de 30 % et **1 500 sangliers**, dont la population peut doubler en une année.

### LE CERF

Le mâle pèse entre 160 et 230 kilos, la femelle ou biche de 90 à 130 kilos. Le mâle porte des bois qu'il perd entre février et mai, la repousse, immédiate, s'achève en août, mais les ramifications augmentent avec l'âge. Le rut a lieu en septembre et octobre (« brame du cerf ») et la biche donne naissance à un jeune chaque année.



### LE SANGLIER

Le mâle pèse de 90 à 150 kilos, la femelle ou laie 70 à 100 kilos. Les mâles sont armés de canines puissantes avec lesquels ils défoncent le sol, à la recherche de nourriture. À partir d'un an, le mâle s'accouple à plusieurs femelles, chacune donnant naissance à 6 à 8 marcassins.



### LE CHEVREUIL

Un adulte pèse entre 20 et 25 kilos, la femelle ou chèvre 2 à 3 kilos de moins. Le mâle ou brocard porte des bois, peu ramifiés, qui tombent chaque année. Chaque femelle donne naissance à 2 jeunes par an.



### LE RENARD

Pouvant atteindre 1,20m du museau au bout de la queue et un poids de 6 à 7 kilos, sa fourrure rousse peut varier du jaune au marron foncé. Carnivore, il se nourrit d'espèces animales nichant au sol (perdrix, cailles, faisans), mais aussi de fruits, d'œufs, d'insectes, de déchets domestiques. Les naissances de 3 à 7 renardeaux ont lieu en mars-avril.



Afin d'assurer la régulation du gibier, l'Office français de la biodiversité établit un plan de chasse pour la période 2023 - 2026. Les prélèvements annuels sur l'ensemble du massif de Fontainebleau (22 000 ha) sont de 248 grands cervidés, 250 chevreuils. Les sangliers ne sont pas soumis au plan de chasse.

Pour pouvoir planter la forêt de demain suite au réchauffement climatique, la population de cerfs, sangliers et chevreuils doit être maîtrisée.

#### Les 4 principaux dégâts forestiers causés par les grands ongulés

**Le vermillis** (affouillement du sol) du sanglier. Avec son groin, appelé boutoir, le sanglier fouille le sol à la recherche de vers et de fruits forestiers (glands, faines...). Ce faisant, il déterre les jeunes semis forestiers (chêne, hêtre, sapin...), ce qui peut nuire fortement à la régénération de la forêt.

**L'abroustissement du cerf et du chevreuil.** C'est-à-dire que l'animal consomme les bourgeons, les feuilles, les aiguilles ou les jeunes pousses des arbres à portée de dents.

**L'écorçage des arbres.** Les cerfs peuvent se nourrir de lambeaux d'écorce du tronc, notamment quand ils sont en sureffectifs.

**Le frottis du cerf et du chevreuil.** Les mâles frottent leurs bois en croissance aux jeunes arbres et arrachent l'écorce, cassant parfois la tige. (Texte ONF)